

انواع سرم و کاربرد آن ها

توسط: بهاره بنی جمالی

► آشنایی با انواع سرم:

► سرم ها جز مواد دارویی هستند که دارای ترکیبات متفاوت بوده و هر کدام از آنها برای بیماری خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. سرم ها دارای ترکیبات آمینو اسیدی، کربوهیدراتی، الکتروولیتی و ... هستند.

ترکیب شیمیایی :

► محلول نمکی

► محلول قندی

► محلول قندی نمکی

► محلول های جایگزینی پلاسمای

► محلول های قلیایی

► محلول های تغذیه ای

محلول های تزریقی نمکی :

سرم نرمال سالین(سرم فیزیولوژیک) حاوی NaCl و ایزوتونیک(۹/۰ درصد) است.

pH محلول ۷-۷/۴ می باشد. در حجم های ۱۰۰ و ۳۰۰ سی سی برای تزریق و شستشو بطور جداگانه بسته بندی شده اند.

• موارد استعمال :

- استفراغ هایی که آب بدن از دست میرود.

- نارسایی کلیه ها که سدیم از بدن از طریق کلیه دفع می شود.

- در دهیدراتاسیون ناشی از کتو اسیدوز دیابتی

- در آلkaloz متابولیک به همراه KCl

- جایگزین برای ترشحات آسپیره شده از طریق ساکشن معده در بیماران جراحی شده

در مجموع میتوان به عنوان حلال مواد دارویی، شستشوی معده، شستشوی بینی و غرغره در تورم لوزه ها، شستشو و پانسمان رخم ها استفاده کرد.



● موارد منع مصرف :

- در سو، تغذیه پیشرفت، که بیماران دچار ادم می گردند.
- در نارسایی کبدی، قلبی، کلیوی همراه با ادم
- در افزایش سدیم (هیپرnatرمی)

● عوارض جانبی:

- اختلال آب و الکترولیت بدن، احتباس آب و ادم، هیپوکالمی، اسیدوز
- قبل از تزریق فشار خون کنترل شود . تاریخ مصرف کنترل شود. در صورت وجود ذرات جامد در سرم از مصرف آن خودداری گردد.

محلول تزریقی رینگر:

محلول تزریقی رینگر با غلظت ایزوتونیک حاوی Cl^- , K^+ , Ca^{2+} , Na^+ اساساً است.

موارد مصرف:

در بیماران گاسترو آنتریت، شوک هیپوولمیک و جلوگیری از هیپوکالمی، جایگزین مایعات از دست رفته در حین عمل جراحی (در صورت نبودن رینگر لادتات) و در تغذیه پارانترال کوتاه مدت به همراه سایر محلول ها.

نکات قابل بررسی:

در صورت تغییر رنگ و کدر بودن محلول، منع مصرف دارد.

افزودن محلول هیپرتونیک بیکربنات سدیم به داخل رینگر ممنوع است. چون با کلسیم موجود در رینگر رسب کلسیم می دهد.



رینگر لاکتات :

در بیماران NPO استفاده می شود. این سرم حاوی CL, K, Ca و Na لاکتات است.

موارد مصرف :

لاکتات سبب قلیایی شدن ادرار و خون می شود. بنابراین جهت اسیدوز، اختلال تعادل آب و الکترولیت ها قبل و پس از جراحی، اسهال، سوختگی و مسمومیت با داروهای اسیدی کاربرد دارد.

موارد منع مصرف :

در کسانی که نارسایی کبدی، کلیوی، قلبی و هپاتیتی دارند، ممنوع است. در هیپوکلمی به علت اینکه لاکتات به بیکربنات تبدیل می شود و بیکربنات باعث انتقال پتاسیم از خارج به داخل و در نتیجه کاهش پتاسیم خون می شود منع مصرف دارد.



محلول های تزریقی قندی:

سرم قندی (دکستروز ۵٪):

ایزوتونیک بوده، فاقد الکترولیت و در حجم های ۵۰۰...۱۰۰۰ میلی لیتر وجود دارد.

در مواقع NPO و همچنین در موارد زیر مورد استفاده است :

تامین انرژی به دنبال فقر غذایی

جراحی ها

درمان دهیدراتاسیون

الکلیسم های مزمن

ورزش های صلوانی مدت که گلوکز پلاسما کاهش می یابد .

درمان back pain



- Serum قندی -٪:**
- فاقد الکترولیت است و خاصیت دیورتیک دارد.**
- موارد استفاده :**
 - تامین انرژی
 - درمان هیپوگلیسمی
 - بیماران نارسایی کلیوی
 - مسمومیت با پتاسیم همراه با انسولین
 - بیمار با تب
 - ادم ریوی

- ▶ سرم قندی 20% و بالاتر:
- ▶ کاملاً هیپرتونیک در بیماران آنوری ممنوع است.
- ▶ موارد استعمال:
 - ▶ شوگ هیپوگلیسمی ، مسمومیت با آب ، ادم کلی .
 - ▶ منع مصرف :
 - ▶ استفاده در اختلالات آب و الکترولیت به تنها می ممنوع باشد.
- ▶ نکات قابل توجه:
 - ▶ تزریق زیر چلده به علت درناک بودن ممنوع است . قبل از تزریق فشار خون کنترل شود .
 - ▶ این محلول ها در افراد دیابتی به همراه انسولین باید مصرف شود .

محلول های قندی - نمکی:

حاوی دکستروز ۵٪ درصد و سدیم کلراید ۰/۹٪ درصد و ایزوتونیک است.

موارد استعمال :

تامین آب و الکترولیت های مورد نیاز

گاستروآنتریت و مسمومیت ها .

موارد منع مصرف :

بیماران تحت درمان با کورتون و دیابتی ممنوع است .





- ▶ سرم ۱/۳ و ۰/۳٪:
- ▶ حاوی ۱/۳ (۰/۳ درصد) سدیم کلراید و ۰/۳ (۰/۳ درصد) دکستروز است.
- ▶ موارد استعمال:
 - ▶ در افراد دیابتی، نارسایی کلیوی، کبدی و، قلبی کاربرد دارد.

دگستران .۱۴ :

ترکیبات آن شامل دگستروز و کلرید سدیم است و به عنوان جانشین پلاسمای خون به کار می رود.

کاربرد: شوک ناشی از خونریزی، سوختگی و جراحی

منع مصرف: در ادم ریوی و بیماران کلیوی.

مانیتول - ۲٪:

هیپرتونیک بوده و از قند مانوز با الکل بدست می‌آید. خاصیت دیورتیک دارد.

این دارو در درمان خیز مغزی برای کاهش فشار داخل جمجمه و کاهش فشار داخل چشم یا برای آماده کردن بیمار برای جراحی داخل چشم، برای تسريع دفع ادراری مواد سالیسیلات، باربیتورات و لیتیم و جلوگیری از آسیب کلیوی ناشی از این داروها، جهت پیشگیری از همولیز در جراحی پروستات و برای اندازه‌گیری سرعت فیلتراسیون گلومرولی کلیه‌ها استفاده می‌شود.

موارد منع مصرف:

اختلالات آب و الکترولیت، هماتوم داخل جمجمه، شوک هیپوولمیک، نارسایی قلبی، هیپوتانسیون، هیپوناترمی، هیپرکالمی



تداخل دارویی:

دیگوکسین و دیورتیک‌ها

● تجویز دارو:

- مانیتول تزریقی در معرض دمای پایین بلوری می شود باید بطريق را در حمام آب داغ - ۰- ۵ درجه یا مجاورت رادیاتور و شوفاژ قرار داده تا با دمای بدن متناسب گردد.
- قبل از تزریق از نظر داشتن بلور چک شود.
- قبل و بعد از تزریق فشار خون بیمار کنترل شود.
- به استثنای بیماران قلبی تزریق در مابقی بیماران سریع صورت گیرد.
- کنترل دفع ادراری بیماران پس از انفوژیون مانیتول بسیار اهمیت دارد. در صورت عدم ترشح ادرار حداقل - به میزان ۳۰-۵۰ سی سی در ساعت تزریق دوز بعدی مانیول ممنوع است.
- اگر بیمار در حین تزریق دچار واکنش آللرژیک گردد بهتر است بطور موقت تزریق سرم قطع گردد.
- تزریق مانیتول و ترانسفوزیون خون به طور همزمان با یک ست مشترک ممنوع است.
- نشت مانیتول به بافت های اطراف ممکن است منجر به ادم و نکروز بافتی گردد.
- مصرف در احتقان قلب و ریه ممنوع است.



سرم آمینو اسیدی (aminogen)

گروه درمانی این سرم تغذیه تزریقی و ماده کالری زا می باشد.
اشکال دارویی آن به صورت آمینو اسید % ۲۰ و % ۱۵ است. ترکیبات آن شامل اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری، نیتروژن و الکترولیت ها می باشد.

موارد مصرف به صورت زیر می باشد:

آنسفالوپاتی کبدی در بیماران مبتلا به سیروز یا هپاتیت، تغذیه حمایتی، تکمیل و حفظ پروتئین بدن از راه تزریق وریدی برای تامین متابولیسم طبیعی و در مواردی که جذب معده - روکه مختل باشد.
مصرف همزمان اسیدهای آمینه با تراسایکلین ممکن است اثرات حفظ کننده پروتئین ها را کاهش دهد.

▶ سرم کربوهیدراتی:

کربوهیدرات ها منابع کالری هستند و گروه درمانی این سرم تامین کننده نیاز غذایی می باشد. در درمان موقتی نارسایی گردش خون و شوک، زمانی که سایر فراورده های افزاینده حجم پلاسمایا در دسترس نباشد، در ادم مغزی و بیماری کلیوی استفاده می شود. مواد این سرم به سرعت متابولیزه شده و منبع کالری و مایعات در بیمارانی که قادر به مصرف کافی آنها از دهان نیستند، می باشد. مصرف این سرم ممکن است منجر به کاهش ویتامین های گروه B شود. این سرم در کوچکی دیابتی منع مصرف دارد.

- ▶ سرم اینترالیپید (Intralipid®) lipovenous:
- ▶ گروه درمانی این سرم محلول غذایی برای تغذیه تمام وریدی می‌باشد. این دارو که از روغن لوپیاک سویا یا آفتتابگردان تهیه می‌شود، مخلوطی از تری گلیسرید های خنثی و عمدتاً اسیدهای چرب به صورت امولسیون روغن در آب است. روغن سویا علاوه بر اسیدهای چرب حاوی امگا ۳ و ۶ است. این فراورده ها پس از متابولیزه شده به عنوان منبع انرژی در بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین افزایش تولید گرما، کاهش کسر تنفسی و افزایش مصرف اکسیژن را موجب می‌شود.

▶ سرم ژلاتین تتعديل یافته (هماکسل) :

▶ از استخوان گاو نر در ساخت آن استفاده می شود و باید در یخچال نگه داری شود. گروه درمانی این سرم ، حجم کننده پلاسمای می باشد. این محلول حجم کننده پلاسمای در موارد شوک ناشی از کاهش حجم خون به علت خونریزی ، سوختگی ، التهاب لوزالمعده ، از دست رفتن آب و الکترولیتها در اثر استفراغ و اسماں مدام ، بیماریهای غده فوق کلیوی و کلیه ها و اغمای دیابتی مصرف می شود. این سرم محلول حامل برای انسولین است و مورد منع مصرف کامل این دارو گزارش نشده است.

Osmolarity: $2 \text{ NA} + (\text{GLUCOSE}/18) + (\text{BUN}/2/8)$

مقدار طبیعی اسمولالیتیه خارج سلولی Mosmol/l ۱۰-+۲۹۰ است

Composition of Commonly Used Intravenous Solutions						
	Glucose	Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	Lactate ^a	Ca ⁺⁺
0.9% Sodium chloride (normal saline)		154		154		
Lactated Ringer solution		130	4	109	28	3
5% dextrose water	50					
5% dextrose in 0.45% sodium chloride	50	77		77		
3% sodium chloride		513		513		

^aConverted to bicarbonate.

با تشکر از توجه شما